MÁS DE 50 años

A SU SERVICIO

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

InterConformity ISO 9001

Pecuarius Laboratorios S.A. de C.V.
Carretera Obregón-Bácum Km. 1
Lada sin costo 01800 716 44 00 | Tel. (52) 644 4 14 65 00
Cd. Obregón, Sonora. México
www.pecuarius.com | info@pecuarius.com



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PECUARIUS

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PECUARIUS LABORATORIOS CONSOLIDA MÁS DE CINCUENTA AÑOS DE SERVICIO APOYANDO EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL MUNDO

MÁS DE 50 años A SU SERVICIO

En la década de los 60 fue fundado el Laboratorio de Patología de la Asociacion de Avicultores del Valle del Yaqui, ubicado en Cd. Obregón, Sonora, al noroeste de México; conocido como Pecuarius Laboratorios, que con una extensa labor y grandes esfuerzos en el área de investigación y desarrollo se convirtió en pionero del desarrollo de vacunas en el país. En la década de los 80, Pecuarius Laboratorios comienza a extender sus actividades hacia la producción de una extensa línea de farmacéuticos y una eficiente línea de desinfectantes y aditivos para alimentos, fruto del esfuerzo y pasión de un equipo especializado comprometido con los productores agropecuarios del país.

Creando un camino de innovación y excelencia, Pecuarius Laboratorios evoluciona constantemente para atender las necesidades del mercado, con avanzada tecnología y modernas líneas de producción que permiten fabricar productos biológicos y farmacéuticos de calidad superior, cumpliendo cabalmente con lo que marcan las normas y estándares de las BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM), logra la CERTIFICACIÓN INTEGRAL otorgada por SAGARPA, que abarca los aspectos de gestión de la calidad, personal, instalaciones, equipos, producción, distribución y control de calidad; certificación que permite iniciar exportaciones a partir del año 2010.

Siempre comprometidos POR LA SALUD DE SU NEGOCIO, Pecuarius se ha distinguido por alcanzar objetivos de éxito que sustentan su posicionamiento en el mercado pecuario. A partir del año 2014 ha portado el distintivo de responsabilidad social empresarial (ESR®) demostrando ser una empresa comprometida con la sociedad y el desarrollo sostenible que apuesta por la excelencia.

En el año 2015, Pecuarius obtiene la certificación ISO 9001:2008 al sistema integral de calidad, sustentando con ello la voluntad de ofrecer siempre los mejores estándares en la oferta de valor a nuestros clientes.

De esta forma, Pecuarius Laboratorios consolida más de cincuenta años de servicio apoyando el crecimiento continuo de la producción pecuaria en el mundo.

VACUNA MIXTA "SOTA CONN-MASS"

REG. SAGARPA B-2782-022

Esta vacuna contiene virus activo de la enfermedad de Newcastle cepa LaSota y de la Bronquitis Infecciosa de las aves serotipos Massachusetts y Connecticut de alto pasaje, cultivados en embriones de pollo libres de patógenos específicos (SPF), estabilizada y envasada al alto vacío.

Presentaciónes:
Frascos de vidrio que contienen 1,000, 5,000, y 10,000 dosis.

Administración y Dosis:
Puede ser administrada por cualquiera de las siguientes vías: ocular, nasal, oral a través del agua de bebida y por aspersión.

CORBAC-II

(BACTERINA CONTRA LA CORIZA INFECCIOSA DE LAS AVES)

REG. SAGARPA B-2782-028

Bacterina aviar en suspensión acuosa de color ámbar claro, que contiene cultivos en medio artificial de *Avibacterium paragallinarum* serotipos A, B y C, inactivados químicamente y adsorbidos en hidróxido de aluminio.

Presentación:
Frasco de plástico que contiene 500 ml.

Administración y Dosis:
Parenteral por inyección subcutánea en la región media-posterior del cuello, o bien, intramuscular en la pechuga, aplicable en aves mayores de 3 semanas de edad en dosis de 0.5 ml.
En aves con peso corporal mayor a los 2 kg aplique 1 ml.
En todos los casos, el momento de aplicación se ajustará a las características propias del programa de vacunación diseñado para cada explotación.

BACTERINA MIXTA AVIAR "CORI-NEW" VIRUS Y BACTERIAS INACTIVADOS Y EMULSIONADOS EN ACEITE

REG. SAGARPA B-2782-009

Esta vacuna contiene cultivos en medio artificial de *Avibacterium paragallinarum* serotipos A, B y C y virus de la enfermedad de Newcastle cepa LaSota, inactivados y emulsionados en aceite.

Administración y Dosis:
La vía de administración es parenteral por inyección subcutánea en la región media-posterior del cuello, o bien, intramuscular en la pechuga, aplicable en aves mayores de 3 semanas de edad en dosis de 0.5 ml.
En aves con peso corporal mayor a los 2 Kg aplique 1 ml.

Presentación:
Frasco de plástico que contiene 500 ml.

NEWCASTLE CLIE

REG. SAGARPA B-2782-091

Esta vacuna contiene virus de la enfermedad de Newcastle cepa LaSota cultivado en embriones de pollo inactivado químicamente y emulsionado en aceite.

Administración y Dosis:
La vía de administración es parenteral por inyección subcutánea en la región media-posterior del cuello.
Aplicar 0.3 ml en aves menores de 2 semanas de edad y en aves mayores de 2 semanas de edad aplicar de 0.5 a 1 ml.
En todos los casos, el momento de aplicación se ajustará a las características propias del programa de vacunación diseñado para cada explotación.

Presentación:
Frasco de plástico que contiene 500 ml.

PECSULPRIM INYECTABLE

REG. SAGARPA Q-2782-011
SULFAMETOXAZOL, TRIMETOPRIM Y LIDOCAINA

Es un quimioterápico bactericida cuya acción corresponde a los antibióticos de amplio espectro. Por su acción contra gérmenes Grampositivos y Gramnegativos, está indicado en infecciones de las vías respiratorias, renales y tracto digestivo.

Dosis:
Adicionar 100 ml de producto en 1,400 ml de suero fisiológico estéril y aplicar 1 ml por Kg. de peso vivo.

Presentaciónes:
Frascos de 100 y 250 ml.

PECKAN INY 10%

REG. SAGARPA Q-2782-007
KANAMICINA

Es recomendado en infecciones de los aparatos respiratorios, genitourinarios y gastrointestinales causadas por microorganismos tales como: *Escherichia coli, Enterobacter spp, Klebsiella spp, Mycobacterium spp, Proteus spp, Salmonella spp, Staphylococcus spp* y *Vibrio.*

Presentación:
Frasco de 500 ml.

Dosis:
25 a 50 mg/Kg.

VACUNA MIXTA "CORINEW-BRON"

REG. SAGARPA B-2782-014

Es una vacuna inactivada y emulsionada en aceite que contiene los virus de la enfermedad de Newcastle cepa LaSota, bronquitis infecciosa serotipo Massachusetts y *Avibacterium paragallinarum* serotipos A, B y C.

Administración y Dosis:
La vía de administración es parenteral por inyección subcutánea en la región media-posterior del cuello o intramuscular en la pechuga.
Aplicable en aves de 2 o más semanas de edad en dosis de 0.5 ml. Revacunación de pollos y aves de postura 0.5 ml.
Reproductoras y progenitoras ligeras 0.5 ml y pesadas 1 ml. En aves con peso corporal mayor a los 2 kg aplique 1 ml.

Presentación:
Frasco de plástico que contiene 500 ml.

VACSIE

REG. SAGARPA Q-2782-030

Es una vacuna inactivada
Para la inmunización de las aves contra la Salmonelosis aviar ocasionada por Salmonella enteritidis.

Administracion y Dosis:
La vía de administración es parenteral por inyección subcutánea en la región media-posterior del cuello o intramuscular en la pechuga.
Aplicar 0.3 ml en aves menores a 4 semanas y 0.5 ml en aves mayores a 4 semanas.
Destino en aves reproductoras, progenitoras, crianza, desarrollo, postura comercial y aves de combate

Presentación
Frasco de plástico conteniendo 50, 100, 250 y 500 ml.

PECGENT-B

REG. SAGARPA Q-2782-098
GENTAMICINA

Para el control y tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes Grampositivos y Gramnegativos sensibles a la acción de la gentamicina tales como: *Enterobacter aerogenes, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp, Shigella spp, Serpulina spp.*
Por su pH neutro es recomendado para su uso en combinación con la vacuna de Marek, ya que no altera las propiedades de ésta.

Dosis:
Para tratamiento y control aplicar 5 a 12 mg/Kg. de peso corporal (eq. a 0.05-0.12 ml/Kg).
Cuando se aplique con la vacuna de Marek: diluir 2 a 4 ml en 200 ml de diluente y aplicar 0.2 ml/ave en la región media posterior del cuello por vía subcutánea.

Presentaciónes:
Frascos de 100, 250 ml.

PECSTREP

REG. SAGARPA Q-2782-020
ESTREPTOMICINA

Salmonelosis, pasteurelosis, colibacilosis, shigelosis, brucelosis, vibriosis, pasteurelosis neumónica y en ERC de las aves para el control de los gérmenes de asociación a micoplasma.

Dosis:
50-100 mg/Kg.

Presentación:
Frasco con 100 g. y diluente de 250 ml.

BIO
BIOLÓGICOS
PECUARIUS LABORATORIOS



INY
INYECTABLES
PECUARIUS LABORATORIOS

PECNORFLOX PREMIX
REG. SAGARPA Q-2782-070
NORFLOXACINA

Recomendado para el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas complicadas, generadas por bacterias sensibles a la fórmula, como: *Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma spp, Pasteurella multocida, Bordetella spp, Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacteroides melaninogenicus y Proteus spp.*

Presentación:
Saco de 20 Kg.

Dosis:
10 a 20 mg/Kg.

PECFLOXIN PREMIX
REG. SAGARPA Q-2782-050
ENROFLOXACINA

Para el tratamiento terapéutico de enfermedades respiratorias, genitourinarias, digestivas, cutáneas y sistémicas, cuyos agentes etiológicos sean sensibles a la fórmula, como: *Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma spp, Pasteurella multocida, Bordetella spp, Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacteroides melaninogenicus, Proteus spp.*

Presentación:
Saco de 20 Kg.

Dosis:
5 a 12 mg/Kg.

VACUNA MIXTA "B1 CONN-MASS"
REG. SAGARPA B-2782-023

Esta vacuna contiene virus activo de la enfermedad de Newcastle cepa Hitchner B1 y de bronquitis infecciosa de las aves, serotipos Massachusetts y Connecticut de alto pasaje, cultivado en embriones de pollo libres de patógenos específicos (SPF), estabilizada y envasada al alto vacío.

Administración y Dosis:
Puede ser administrada por cualquiera de las siguientes vías: ocular, nasal, oral a través del agua de bebida y por aspersión.

Presentaciónes:
Frascos de vidrio que contienen 1,000, 5,000, 10,000 y 15,000 dosis.

PECBUR
REG. SAGARPA B-2782-026

Es una vacuna que contiene virus activo de la infección de la bolsa de Fabricio (enfermedad de Gumboro) cepa 2512, cultivado en embriones de pollo libres de patógenos específicos (SPF), estabilizada y envasada al alto vacío.

Administración y Dosis:
Puede ser administrada por cualquiera de las siguientes vías: ocular, nasal y oral en el agua de bebida y por aspersión.

Presentaciónes:
Frascos de vidrio que contienen 100, 1,000, 5,000, 10,000 y 15,000 dosis.

PECFLOR PREMIX 8%
REG. SAGARPA Q-2782-110
FLORFENICOL

Salmonella dublin, Staphylococcus pyogenes, Bordetella bronchiseptica, Rickettsias, Mycobacterium spp, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Brucella spp, Aerobacter aerogenes, Pasteurella spp, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Bacillus anthracis, Corynebacterium pyogenes y Erysipelothrix rhusiopathiae.

Dosis:
Mezclado con el alimento a razón de 250 a 500 g por tonelada de alimento, equivalente a 20 mg/kg de P.V. durante 7 días en aves.

Presentación:
Saco de 20 Kg.

PECPIDOL-S
REG. SAGARPA Q-2782-010
CLOPIDOL Y SULFAGUANIDINA

Anticoccidiano, indicado para el tratamiento de coccidiosis causada por las especies de *Eimeria tenella, E. acervulina, E. maxima, E. necatrix y E. brunetti.*

Dosis:
13 mg de clopidol/Kg.

Presentación:
Saco de 25 Kg.

VACUNA MIXTA PENTAVAC
REG. SAGARPA B-2782-019

Es una vacuna inactivada y emulsionada en aceite que contiene los virus de la enfermedad de Newcastle cepa LaSota, bronquitis infecciosa serotipo Massachusetts, Gumboro, *Pasteurella multocida y Avibacterium paragallinarum* serotipos A, B y C.

Administración y Dosis:
La vía de administración es parenteral por inyección subcutánea en la región mediaposterior del cuello o intramuscular en la pechuga. Aplicable en aves de 8 o más semanas de edad en dosis de 0.5 ml.
Reproductoras y progenitoras ligeras 0.5 ml y pesadas 1 ml. En aves con peso corporal mayor a los 2 kg aplique 1 ml.

Presentación:
Frasco de plástico que contiene 500 ml.

CORINEWBRON+EDS
REG. SAGARPA B-2782-031

Es una vacuna inactivada y emulsionada en aceite que está diseñada para polla de reemplazo. Auxiliar en programas de prevención de la coriza infecciosa de las aves, enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infeccciosa y Síndroma de baja postura.

Administración y Dosis:
La vía de administración es parental por inyección subcutánea en la región media-posterior del cuello, o bien, intramuscular en la pechuga.

En aves mayores de 10 semanas de edad aplicar en dosis de 0.5 ml.

Presentación:
Frasco de plástico que contiene 500 ml

PECSULDOT
REG. SAGARPA Q-2782-036
3.5-DINITRO-ORTO-TOLUAMIDA, SULFAGUANIDINA

Es una mezcla que contiene DOT y una sulfonamida, que sinérgicamente actúan tanto en los estadios asexuales de las coccidias como contra los esquizontes de segunda generación, impidiendo su desarrollo.

Dosis:
9 a 13 mg de DOT/Kg.

Presentación:
Saco de 25 Kg.

PREMIX
PREMEZCLAS
PECUARIUS LABORATORIOS

BIO
BIOLÓGICOS
PECUARIUS LABORATORIOS

VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE CEPA B1

REG. SAGARPA B-2782-003

Esta vacuna contiene virus activo de la enfermedad de Newcastle cepa Hitchner B1, cultivada en embriones de pollo libres de patógenos específicos (SPF), estabilizada y envasada al alto vacío.

Administración y Dosis:
Puede ser administrada por cualquiera de las siguientes vías: ocular, nasal, oral a través del agua de bebida y por aspersión.

Presentaciónes:
Frascos de vidrio que contienen 1,000, 5,000 y 10,000 dosis.

VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE CEPA LASOTA LIOFILIZADA

REG. SAGARPA B-2782-002

Esta vacuna contiene virus activo de la enfermedad de Newcastle cepa LaSota, cultivado en embriones de pollo libres de patógenos específicos (SPF), estabilizada y envasada al alto vacío.

Administración y Dosis:
Puede ser administrada por cualquiera de las siguientes vías: ocular, nasal, oral a través del agua de bebida y por aspersión.

Presentaciónes:
Frascos de vidrio que contienen 100, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 y 25,000 dosis.

PECSULPRIM PREMIX

REG. SAGARPA Q-2782-014
TRIMETOPRIM Y SULFAMETOXAZOL

Es recomendado en el control y terapia de procesos infecciosos respiratorios, digestivos, genitourinarios y sistémicos generados por bacterias susceptibles a la fórmula, como: *Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Bordetella bronchiseptica, así como algunas especies de Streptococcus, Staphylococcus y Corynebacterium.*

Presentación:
Saco de 20 Kg.

Dosis:
30 a 50 mg de sulfametoxazol + trimetoprim/Kg.

PECTYL PREMIX

REG. SAGARPA Q-2782-037
TILOSINA

Mycoplasma gallisepticum, M. hyorhinis, M. hyopneumoniae, M. agalactiae, M. synoviae, Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, Clostridium spp, Neisseria spp, Actinobacillus spp y sinusitis infecciosa de las aves

Dosis:
10 a 20 mg/Kg.

Presentación:
Saco de 20 Kg.

VACUNA CONTRA LA ENCEFALOMIELITIS AVIAR

REG. SAGARPA B-2782-013

Esta vacuna contiene virus activo de la encefalomielitis aviar cepa Calnek 1143, cultivada en embriones de pollo libres de patógenos específicos (SPF), estabilizada y envasada al alto vacío.

Administración y Dosis:
Por vía oral directa o a través de agua de bebida.

Presentaciónes:
Frascos de vidrio que contienen 1,000, 5,000, 10,000 y 15,000 dosis.

VACUNA CONTRA LA VIRUELA AVIAR CEPA FUERTE

REG. SAGARPA B-2782-005

Esta vacuna contiene virus activo de la viruela aviar cepa homóloga, cultivado en embriones de pollo libres de patógenos específicos (SPF), estabilizada y envasada al alto vacío.

Administración y Dosis:
Punción en la membrana del ala.

Presentación:
Frasco de vidrio que contiene 1,000 dosis, con diluente de 10 ml y lanceta.

PECVERMIN 0.6% PREMIX

REG. SAGARPA Q-2782-077
IVERMECTINA

Por su amplio rango de acción y características farmacocinéticas y farmacodinámicas está recomendado para resolver problemas de nemátodos de porcinos.
Es útil en el tratamiento de parásitos internos y externos en sus etapas de crecimiento y reproducción.

Presentación:
Cubeta de 5 Kg.

Dosis:
De 0.2 a 1.0 mg de ivermectina/Kg.

PECXITETRA PREMIX

REG. SAGARPA Q-2782-025
OXITETRACICLINA

Es recomendado en el tratamiento terapéutico de enfermedades respiratorias y digestivas cuyos agentes etiológicos sean sensibles a la fórmula, como en coriza infecciosa, cólera aviar y micoplasmosis.

Dosis:
10 a 52 mg/Kg.

Presentación:
Saco de 30 kg.

PECXITETRA PREMIX 20%

REG. SAGARPA Q-2782-091
OXITETRACICLINA

Es recomendado en el tratamiento terapéutico de enfermedades respiratorias y digestivas cuyos agentes etiológicos sean sensibles a la fórmula, como en coriza infecciosa, cólera aviar y micoplasmosis.

Dosis:
De 10 a 52 mg/Kg.

Presentación:
Saco de 30 Kg.

BIO
BIOLÓGICOS
PECUARIUS LABORATORIOS

PREMIX
PREMEZCLAS

PECXITETRA T.S

REG. SAGARPA Q-2782-033

OXITETRACICLINA, SULFAMETOXAZOL Y TRIMETOPRIM

Es recomendado en el tratamiento terapéutico de enfermedades respiratorias y digestivas de aves, cuyos agentes etiológicos sean sensibles a la fórmula, como: *Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma spp, Escherichia coli, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Leptospira spp.*

Presentación:
Saco de 20 Kg.

Dosis:
Preventivo: De 5 a 10 mg de oxitetraciclina/Kg.
Curativo: De 21 a 42 mg de oxitetraciclina/Kg.

PECLOR PREMIX 20%

REG. SAGARPA Q-2782-096

CLORTETRACICLINA HCL

Es recomendado en el tratamiento terapéutico de enfermedades respiratorias y digestivas tales como: ERC, micoplasmosis y colibacilosis.

Dosis:
20 a 50 mg/Kg.

Presentación:
Saco de 25 Kg.

PECAMOXIL PREMIX 20%

REG. SAGARPA Q-2782-097

AMOXICILINA

Es recomendado en el tratamiento terapéutico de enfermedades digestivas, respiratorias, genitourinarias, cutáneas, articulares e infecciones septicémicas causadas por gérmenes susceptibles a la acción de la amoxicilina tales como: *Pasteurella spp, Haemophilus spp, Ornithobacterium rhinotracheale, Salmonella spp, Shigella spp y Clostridium spp.*

Presentación:
Saco de 20 Kg.

Dosis:
10 mg/Kg.

PECTYL-F

REG. SAGARPA Q-2782-099

TILOSINA FOSFATO

Utilizado en la prevención y tratamiento de enfermedad crónica respiratoria causada por *Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae y Clostridium spp.*

Dosis:
25 mg/Kg de peso corporal.

Presentación:
Saco de 20 Kg.

VACUNA CONTRA LA VIRUELA AVIAR CEPA SUAVE

REG. SAGARPA B-2782-008

Esta vacuna contiene virus activo de viruela aviar cepa heteróloga, cultivado en embriones de pollo libres de patógenos específicos (SPF), estabilizada y envasada al alto vacío.

Dosis:
Punción en la membrana del ala.

Presentación:
Frasco de vidrio que contiene 1,000 dosis, con diluente de 10 ml y lanceta.

PEC POX+EA

REG. SAGARPA B-2782-027

Esta vacuna contiene los virus activos de la enfermedad de viruela aviar cepa homóloga y de encefalomielitis aviar cepa Calnek 1143, cultivada en embriones de pollo libres de patógenos específicos (SPF).

Dosis:
Punción en la membrana del ala.

Presentaciónes:
Frascos de vidrio que contienen 1,000 y 5,000 dosis, con diluente de 10 o 50 ml y lanceta.

VACUNA CONTRA LA BRONQUITIS INFECCIOSA DE LAS AVES CEPA SUAVE

REG. SAGARPA B-2782-006

Esta vacuna contiene el virus activo serotipo Massachusetts tipo holandés de alto pasaje, cultivado en embriones de pollo libres de patógenos específicos (SPF), estabilizada y envasada al alto vacío.

Dosis:
Puede ser administrada por cualquiera de las siguientes vías: ocular, nasal, oral a través del agua de bebida y por aspersión.

Presentaciónes:
Frascos de vidrio que contienen 100, 1,000, 5,000, 10,000 y 15,000 dosis.

VACUNA DE "BRONQUITIS CONN-MASS"

REG. SAGARPA B-2782-024

Esta vacuna contiene virus activo de la bronquitis infecciosa de las aves serotipos Massachusetts y Connecticut de alto pasaje, cultivado en embriones de pollo libres de patógenos específicos (SPF), estabilizada y envasada al alto vacío.

Dosis:
Puede ser administrada por cualquiera de las siguientes vías: ocular, nasal, oral a través del agua de bebida y por aspersión.

Presentaciónes:
Frascos de vidrio que contienen 100, 1,000, 5,000, 10,000 y 15,000 dosis.

PREMIX
PREMEZCLAS
PECUARIUS LABORATORIOS

BIO
BIOLÓGICOS
PECUARIUS LABORATORIOS

PECLORAM-T

REG. SAGARPA Q-2782-102

CLORAMINA-T

Posee acción desinfectante de amplio espectro con efecto bactericida sobre bacterias Gramnegativas y Grampositivas, además de una baja toxicidad, baja tensión de vapor y fácil aplicación, controlando la contaminación por hongos en la cama del nido.

Dosis:
Espolvoreado.

Aplicar 10 g de producto por cada nido.

Repetir cada 3 o 4 semanas según los factores climáticos y el estado sanitario de la cama.

Presentación:
Saco de 25 Kg.

PEC-YOD 10%

REG. SAGARPA Q-2782-001

COMPLEJO YODO-NONOXINOL ÁCIDO FOSFÓRICO

Se recomienda para desinfectar y sanitizar equipo pecuario general, procesadoras de leche, rastros, potabilización de agua de bebida, zonas corporales de los animales, así como tapetes sanitarios e instalaciones pecuarias, vehículos, limpieza y desinfección de manos.

Dosis:
Por aspersión e inmersión.

Potabilización de agua: 10 ml en 100 litros de agua.

Desinfección de manos y ubres: 10 ml en 70 litros de agua.

Desinfección de instalaciones: 10 ml en 10 a 40 litros de agua.

Desinfección de equipos, utensilios y bebederos: 10 ml en 10 a 20 litros de agua.

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

PECAMPLIN P.S.

REG. SAGARPA Q-2782-040

AMPICILINA

Prevención y tratamiento de las siguientes enfermedades infecciosas de las aves: coriza, colibacilosis, cólera aviar, shigelosis, enteritis infecciosa, espiroquetosis aviar, infecciones piogénicas provocadas por estafilococos y estreptococos spp, y sinusitis infecciosa.

Dosis:
Curativo: 30 a 40 mg/Kg.

Presentación:
Bolsa de 500 g.

PEC-EXPEC

REG. SAGARPA Q-2782-016

CLORURO DE AMONIO, GUAYACOLATO DE GLICERILO, YODURO DE POTASIO Y CLORURO DE SODIO

Es recomendado como auxiliar en el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio. Su efecto expectorante ayuda a fluidificar las secreciones mucosas en aves.

Dosis:
5 g en 10 o 20 litros.

Presentación:
Bolsa de 2 Kg.

PECRESOL

REG. SAGARPA Q-2782-030

FORMALINA, ISOPROPANOL, CRESOLES Y CLORURO DE BENZALCONIO

Está indicado para desinfectar superficies como pisos y paredes de bodegas, corrales, instrumental quirúrgico, mesas de trabajo de material no corrosible, superficies exteriores de vehículos, calzado de hule, vados y tapetes sanitarios.

Dosis:
Por aspersión e inmersión.

Desinfección normal: 1 litro en 100 litros de agua (1 ml en 100 ml de agua).
Desinfección enérgica: 1 litro en 50 litros de agua (1 ml en 50 ml de agua).

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

PEC-EXPEC 3A

REG. SAGARPA Q-2782-088

PARACETAMOL, BROMHEXINA HCl, GUAIFENESIN, PIROXICAM

Se recomienda en problemas respiratorios que cursen con fiebre, dolor, inflamación y/o producción de moco, por causas infecciosas o de otro tipo como polvos irritantes en el ambiente. También se puede administrar como tratamiento sintomático en problemas músculo-esqueléticos, septicémicos o lesiones causadas por el manejo de los animales que cursen con signos de fiebre, inflamación y dolor, además de favorecer la descongestión de las vías respiratorias y facilitar la acción de los antibióticos.

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

Dosis:
Dosificar a razón de 250 a 500 ml en 1,000 litros de agua, según la severidad del problema.

PECFLOR SOLUCIÓN

REG. SAGARPA Q-2782-075

FLORFENICOL

Está indicado en el tratamiento de enfermedades de las aves causadas por microorganismos susceptibles Gramnegativos y Grampositivos tales como: *Gallibacterium anatis, Pasteurella multocida, E. coli, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Corynebacterium pyogenes y Clostridium spp.*

Dosis:
20 mg/Kg.

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

PECFENICOL SOLUCIÓN

REG. SAGARPA Q-2782-073

TIAMFENICOL

Contiene un antibiótico de amplio espectro y se recomienda para el control de enfermedades digestivas y respiratorias en aves, tales como: colibacilosis, salmonelosis, micoplasmosis, coriza, cólera aviar y estafilococosis.

Dosis:
De 15 a 30 mg/Kg.

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

BIOSEG
BIOSEGURIDAD
PECUARIUS LABORATORIOS

SOLUBLES & SOLUCIONES
PECUARIUS LABORATORIOS

PECFLOXIN 10%
REG. SAGARPA Q-2782-060
ENROFLOXACINA

Es un quimioterápico bactericida cuya acción corresponde a los antibióticos de amplio espectro. Por su acción contra gérmenes Grampositivos, Gramnegativos y micoplasmas, está indicado en infecciones de las vías respiratorias, urinarias y del tracto digestivo causadas por microorganismos sensibles a la fórmula.

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

Dosis:
10 mg/kg.

PECFOCINA
REG. SAGARPA Q-2782-089
FOSFOMICINA

Para el tratamiento de infecciones en aves y porcinos tales como enteritis, colibacilosis, coriza infecciosa, cólera aviar y salmonelosis causadas por microorganismos Grampositivos y Gramnegativos.

Dosis:
10 mg/Kg.

Presentaciónes:
Garrafones de 1.5 y 20 Lt.

PECBENZOL 30%
REG. SAGARPA Q-2782-049
CLORURO DE BENZALCONIO

Se recomienda para desinfectar y sanitizar superficies, en la limpieza de manos, uñas y brazos. Está indicado para la desinfección de utensilios e instalaciones debido a su excelente efecto residual y acción germicida en un pH alcalino, con reducido efecto negativo por presencia de materia orgánica.
Es útil en la estrategia de control de *Salmonella spp y Escherichia coli.*

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

Dosis:
Aplicación por aspersión e inmersión.

Para desinfectar la piel, mucosas, heridas y uso general: 10 ml en 10 litros de agua.

En locales, implementos ganaderos o avícolas, instrumental y utensilios: 3 a 5 ml en 1 litro de agua.

Para desinfectar huevo fértil: 1 ml por litro de agua.

PECBENZOL-DET
REG. SAGARPA Q-2782-103
CLORURO DE BENZALCONIO Y DETERGENTE NO IÓNICO

Es un germicida detergente que se recomienda para desinfección de equipo general, instalaciones avícolas, porcícolas y ganaderas, y huevo, desinfección de zonas corporales de los animales (bovinos, porcinos y aves), y puede aplicarse directamente sobre las superficies o por aspersión.

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

Dosis:
Aplicación por aspersión e inmersión.

Para desinfectar la piel, mucosas, heridas y uso general: 10 ml en 3 a 15 litros de agua.

En locales, implementos ganaderos o avícolas, instrumental y utensilios: 10 a 15 ml en 3 litros de agua.

Para desinfectar huevo fértil: 1 ml por litro de agua.

PEC-HIDRAT
REHIDRATANTE ORAL

Es una mezcla de electrólitos para prevenir y tratar deshidratación en aves, causada por enfermedades, temperaturas altas y por el estrés del transporte, vacunación y despique.

Dosis:
En agua de bebida: 250 g por cada 200 litros de agua.
En alimento: 250 g por cada 100 Kg de alimento.

Presentación:
Bolsa de 2.5 Kg.

PECNEOKAN
REG. SAGARPA Q-2782-008
KANAMICINA Y NEOMICINA

Combinación de antibióticos recomendados en las siguientes infecciones de aves: artritis, coriza, enteritis inespecífica, ECR, onfalitis, salmonelosis, shigelosis y sinusitis.

Dosis:
20 mg de kanamicina/Kg.

Presentación:
Bolsa de 500 g.

PECDESIN
REG. SAGARPA Q-2782-002
FORMALINA, FENOL, CLORURO DE BENZALCONIO Y METANOL

Está indicado para desinfectar superficies como pisos y paredes de bodegas, corrales, instrumental quirúrgico, mesas de trabajo de material no corrosible, superficies exteriores de vehículos, calzado de hule, vados y tapetes sanitarios.

Dosis:
Por aspersión o inmersión.

1 litro en 200 litros de agua (1 ml en 200 ml de agua).

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

PECDESIN-DET
REG. SAGARPA Q-2782-053
FORMALINA, FENOL, CLORURO DE BENZALCONIO Y DETERGENTE NO IÓNICO

Está indicado para desinfectar superficies de pisos y paredes de bodegas, corrales, instrumental quirúrgico, mesas de trabajo de material no corrosible, superficies exteriores de vehículos, calzado de hule, vados y tapetes sanitarios.

Dosis:
Por aspersión e inmersión.

1 litro en 200 litros de agua (1 ml en 200 ml de agua).

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

PECOLICINA-SP SOLUBLE
REG. SAGARPA Q-2782-064
LINCOMICINA Y ESPECTINOMICINA

En la prevención y tratamiento de enteritis asociada con *E. coli*, erisipela y artritis infecciosa y para la micoplasmosis aviar (ECR) y complicada con *E. coli.*

Dosis:
20 a 30 mg de lincomicina + espectinomicina/Kg.

Presentación:
Bolsa de 2 Kg.

PECFORMIN
AUT. SAGARPA A-2782-095

Está indicado para la preservación del alimento animal y/o ingredientes alimenticios, manteniéndolos libres de bacterias patógenas como *Salmonella spp y E. coli.*

Dosis:
Alimento completo:
1 a 2 kg/tonelada de alimento (equivalente a 0.92 a 1.84 litros).

Ingredientes alimenticios:
3 a 5 kg/ tonelada de ingredientes alimenticios (equivalente a 2.76 a 4.60 litros).

Presentaciónes:
20, 200 y 1,000 Lt.

PECTRIACID
AUT. SAGARPA A-2782-107
ÁCIDO FÓRMICO, ÁCIDO ACÉTICO Y ÁCIDO PROPIÓNICO

Aditivo para el tratamiento de alimento balanceado con efecto fungicida, bactericida y salmonelicida, sin afectar las cualidades del alimento o ingredientes alimenticios destinados a la nutrición animal.

Dosis:
Alimento completo: 1 a 2 kg/ton de alimento.
Ingredientes alimenticios: 3 a 5 kg/ton de ingredientes alimenticios.

Presentaciónes:
200 y 1,000 Lt.

PECSALISYL POLVO
REG. SAGARPA Q-2782-015
ÁCIDO 2-ACETILOXIBENZOICO

Se recomienda como analgésico y antipirético en los estados de tensión por despique, vacunación y temperatura ambiental alta.

Dosis:
En agua de bebida y alimento 100 mg/kg.

Presentación:
Bolsa de 1 Kg.

PECSULPRIM
REG. SAGARPA Q-2782-003
SULFAMETOXAZOL Y TRIMETOPRIM

Por su acción contra gérmenes Grampositivos y Gramnegativos está indicado en infecciones de las vías respiratorias y tracto digestivo causadas por microorganismos sensibles a la fórmula.

Dosis:
De 15 a 30 mg de sulfametoxazol + trimetoprim/Kg.

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

PECBIACID
AUT. SAGARPA A-2782-108
ÁCIDO PROPIÓNICO, ÁCIDO FÓRMICO

Está indicado para prevenir y disminuir la presencia de hongos, micotoxinas y enterobacterias sin afectar las cualidades del alimento o ingredientes alimenticios a los que se aplica para la alimentación animal.

Dosis:
De 1.5 a 3.5 kg/ton de material a tratar.

Presentaciónes:
20, 200 y 1,000 Lt.

PECDETOX
AUT. SAGARPA A-2782-109
SECUESTRANTE DE MICOTOXINAS

Aditivo de acción múltiple: Detoxificante de micotoxinas, con efecto inmunomodulador, y prevención de la adhesión de patógenos entéricos.

Dosis:
1.5 Kg de producto por tonelada de alimento.

Presentación:
Saco de 25 Kg.

PECTRESUL
REG. SAGARPA Q-2782-047
SULFAMETAZINA SÓDICA, SULFATIAZOL SÓDICO

Esta combinación actúa únicamente en el tracto digestivo, teniendo su máximo efecto sobre los esquizontes de segunda generación, razón por la cual es una excelente opción en el tratamiento de coccidiosis clínica.

Dosis:
50 mg suma de las tres sulfas/Kg.

Presentación:
Bolsa de 2 Kg.

PECTRINOX-K
REG. SAGARPA Q-2782-039
SULFAQUINOAXALINA SÓDICA, TRIMETOPRIM Y VITAMINA K

Es un quimioterápico bactericida cuya acción corresponde a los antibióticos de amplio espectro. Administrado en el agua de bebida de las aves ha demostrado efectividad terapéutica contra *Eimeria tenella, E. necatrix, E.acervulina, E.brunetti, Pasteurella multocida y Escherichia coli.*

Dosis:
De 12 a 24 mg de sulfaquinoxalina sódica + trimetoprim/Kg.

Presentación:
Bolsa de 2 Kg.

PECTROCINA PS
REG. SAGARPA Q-2782-055
OXITETRACICLINA Y ERITROMICINA

Esta combinación de antibióticos es recomendada para el tratamiento y prevención de enfermedades del sistema digestivo y respiratorio de las aves, causadas por microorganismos sensibles a la fórmula tales como *Pasteurella spp, Haemophilus spp, Mycoplasma spp, Clostridia y Corynebacterium.*

Dosis:
30 mg de oxitetraciclina + eritromicina/Kg.

Presentación:
Bolsa de 1 Kg.



PECTYL-C
REG. SAGARPA Q-2782-035
TILOSINA

Para la prevención y tratamiento de la enfermedad crónica respiratoria causada por *Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae* y sinusitis infecciosa de las aves.

Dosis:
35 a 40 mg/Kg.

Presentación:
Bolsa de 1 Kg.

PECVITAM-B
MULTIVITAMÍNICO

Es un polivitamínico diseñado para administrarse en estado crítico del crecimiento, durante los periodos de estrés, como son despique, vacunación, castración, traslado y cambio de clima, durante las enfermedades y su convalecencia y en general, en estados deficitarios de la fórmula.

Dosis:
En agua de bebida
1 a 2 g por cada 10 litros de agua. Prepare y cambie el agua medicada cada 24 horas.

Presentación:
Bolsa de 2 Kg.

PECTRAZURIL
REG. SAGARPA Q-2782-104
TOLTRAZURIL

Es efectivo contra una amplia variedad de coccidias, tales como: *Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria tenella, Eimeria mivati, Eimeria necatrix.*

Dosis:
Oral en el agua de bebida durante 48 horas.
7 mg/kg.

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

PECAMOXIL PS
REG. SAGARPA Q-2782-101
AMOXICILINA

Pasteurella spp, Haemophilus spp, Ornithobacterium rhinotracheale, Salmonella spp, Shigella spp y Clostridium spp.

Presentación:
Bolsa de 1 Kg.

Dosis:
10 mg/Kg.

PECXITETRA-B
REG. SAGARPA Q-2782-056
OXITETRACICLINA

Tratamiento de las enfermedades susceptibles a la acción de la oxitetraciclina en aves, como coriza infecciosa, cólera aviar y micoplasmosis.

Dosis:
En agua de bebida: 40 mg/Kg.
En alimento: 20 mg/Kg.

Presentación:
Bolsa de 2 Kg.

PECFLOXIN 30%
REG. SAGARPA Q-2782-100
ENROFLOXACINA

Es un quimioterápico bactericida cuya acción corresponde a los antibióticos de alto espectro por su acción contra gérmenes Grampositivos, Gramnegativos y micoplasmas.

Dosis:
10 mg de substancia activa por kilogramo de peso corporal.

Presentaciónes:
Garrafones de 5 y 20 Lt.

PECMICOCINA
REG. SAGARPA Q-2782-112
TILMICOSINA

Es un antibiótico de amplio espectro efectivo para el tratamiento y prevención de infecciones bacterianas causadas por gérmenes susceptibles a la acción de tilmicosina.

Dosis:
Oral en el agua de bebida
15 a 20 mg/kg p.v. que equivale de 0.34 a 0.46 de producto por 1000 L durante 3 a 5 días.

Presentaciones
Garrafones de 1, 5 y 20 lt.

PECBROXOL PS
REG. SAGARPA Q-2782-116
AMBROXOL HCl 10%

Es un expectorante y mucolitico utilizado por sus propiedades en la disminución de la viscosidad de las secreciones bronquiales ayudando a facilitar la expulsión de las mismas

Dosis:
Aves: 0.5 mg de ingrediente activo/kg. de peso/día que equivale a 47.6 grs. de producto terminado/ton de alimento o 32.78 g. de producto terminado/1000 l. de agua durante 5 días.

Presentaciones
Bolsa de 1 y 2 kgs..

PECXILINA PS
REG. SAGARPA Q-2782-105
DOXICICLINA

Para el tratamiento de infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias, causadas por microorganismos sensibles a la fórmula.

Dosis:
Pollo de engorda:
20 mg de sustancia activa por kilogramo de peso corporal durante 3-5 días.

Presentación:
Bolsa de 2 Kg.

SOLUBLES & SOLUCIONES
PECUARIUS LABORATORIOS

SOLUBLES & SOLUCIONES
PECUARIUS LABORATORIOS